



TODO EN X

Los implantes dentales All-on-4 o implantes dentales All-on-X son un tipo único de procedimiento que soporta un arco completo de dientes utilizando varios implantes, en lugar de un implante por diente. All-on-X generalmente se recomienda para pacientes a quienes les faltan o pueden perder la mayoría de sus dientes y que buscan una solución rentable y a largo plazo para recuperar su función y sonrisa completas.

All-on-X es una opción popular porque ofrece una solución permanente a largo plazo para varios dientes perdidos. All-on-X es una buena opción para los pacientes que prefieren una solución más fija en lugar de una dentadura postiza a presión o dentaduras postizas tradicionales que deben retirarse todas las noches. Existe una variedad de beneficios inmediatos y a largo plazo que disfrutará después de sus implantes dentales All-on-X, incluidos los siguientes:

- Rentable
- Resultados más rápidos y tiempo de recuperación más rápido
- Menos molestias que las dentaduras postizas
- Material menos voluminoso en comparación con una dentadura postiza tradicional
- Menos alteración en el gusto y la satisfacción/sensación de los alimentos (debido a menos material, especialmente en el paladar)
- Funciona como natural dientes
- Mantiene la integridad de la estructura ósea y previene la pérdida ósea adicional.

Después de una consulta inicial, revisión de su historial médico, imágenes tridimensionales y radiografías, su periodoncista determinará qué opciones de tratamiento se adaptan mejor a sus necesidades específicas. A continuación, su periodoncista examinará su mandíbula para asegurarse de que haya una cantidad adecuada de hueso para mantener los implantes en su lugar. Si es un buen candidato para un procedimiento All-on-X, su periodoncista coordinará con su dentista general, ya que se trata de un esfuerzo de equipo.

Si se determina que los implantes dentales All-on-X son la opción de tratamiento óptima para usted, su periodoncista planificará la colocación del implante de manera que se maximice el soporte para la dentadura postiza evitando estructuras anatómicas clave como los senos paranasales y los nervios. La cantidad de implantes utilizados para cada arco suele ser de cuatro a seis, dependiendo de su caso particular y de lo que su periodoncista considere más adecuado para usted.

El día del tratamiento, lo sedarán y le administrarán anestesia local. El tipo de anestesia que se utiliza puede variar, dependiendo de la gravedad de su caso y de su sensibilidad general. Una vez que esté adecuadamente adormecido y cómodo, se extraerán los dientes enfermos, flojos o rotos. A continuación, se colocan los implantes en el hueso de la mandíbula. Si se logra una estabilidad adecuada en los implantes, se le proporcionará una prótesis temporal que se atornilla a los implantes. Después de dejar que sane aproximadamente 3 meses, regresará al consultorio de su dentista general y se realizará la restauración permanente.

TODO EN X

Que esperar:

- Recetas
- Malestar leve a moderado
- Inflamación
- Suturas solubles
- Citas postoperatorias con su periodoncista y dentista general.
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico sobre cómo tomarlos antes de la cirugía.

Instrucciones preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.

Instrucciones

postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de la cirugía durante 6 semanas.
- No bebidas carbonatadas durante 1 semana.
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio durante al menos 1 semana.
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas, compresa tibia después de 24 horas
- Kit de curación StellaLife: el equipo dental revisará cómo usarlo
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas. Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.