



BIOPSIA

Una biopsia es un procedimiento quirúrgico que obtiene tejido de la cavidad bucal del paciente para un examen microscópico, generalmente para formar un diagnóstico e identificar el tratamiento adecuado para una anomalía. Se puede recomendar una biopsia para una lesión oral que ha estado presente durante más de 2 semanas y no ha desaparecido, cambios inflamatorios en la cavidad oral de causa desconocida, lesiones óseas que no se identifican específicamente mediante el examen clínico y las radiografías, o cualquier lesión que tenga las características de una malignidad.

Uno de los signos más comunes de la presencia de cáncer oral son los cambios notables en la mucosa, que normalmente debería tener un aspecto rosado y liso. Su dentista realiza exámenes de detección de cáncer oral durante su examen anual y probablemente notará los cambios tan pronto como ocurran. Si hay un cambio, es posible que le recomienden que su periodoncista tome una biopsia del área afectada, que luego será enviada a un laboratorio para determinar la causa del cambio. Una vez que se haya llegado a un diagnóstico, su periodoncista discutirá las opciones de tratamiento. Afortunadamente, la mayoría de los cambios patológicos que ocurren no ponen en peligro la vida; sin embargo, la tasa de diagnósticos de cáncer oral está aumentando y es importante detectarlo lo antes posible.

Una vez que el patólogo bucal haya revisado la muestra, se enviará un informe a su periodoncista. A partir de ahí, su periodoncista revisará los hallazgos con usted y determinará la atención de seguimiento según sea necesario.

BIOPSY

Que esperar:

- Posibles espacios entre los dientes.
- Posible exposición de los márgenes de la corona.
- Sensible a la temperatura
- Malestar leve/moderado
- Inflamación
- Posible recesión de las encías en dientes adyacentes.
- Posibles suturas
- Citas postoperatorias: para repasar el informe de patología
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico sobre cómo tomarlos antes de la cirugía.

Instrucciones preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.

Instrucciones

postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de una cirugía; sin carbonatación
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas
- StellaLife Enjuague 3 veces al día hasta terminar el biberón
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas. Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.