

ALARGAMIENTO DE LA CORONA

El alargamiento de la corona es una buena opción para los pacientes que necesitan exponer más la estructura dental, ya sea por estética o por función. Los pacientes que muestran una cantidad excesiva de tejido de las encías cuando sonríen (sonrisa gingival) pueden ser buenos candidatos para un procedimiento de alargamiento de la corona. Esto implica extraer una cantidad pequeña pero precisa de tejido de las encías y hueso. Al hacerlo, se expone más diente o dientes, reduciendo así la apariencia de una sonrisa gingival. El alargamiento de corona es un procedimiento popular porque es rápido, relativamente indoloro y da resultados casi inmediatos.

El alargamiento de la corona también se realiza comúnmente junto con la colocación de una corona dental. Es posible que su dentista necesite un periodoncista para eliminar el exceso de tejido de las encías y el hueso alrededor de un diente para poder tratar la caries y colocar una corona dental para restaurar su función masticatoria.

El día del tratamiento el periodoncista adormecerá la zona utilizando un anestésico local. Una vez que esté adecuadamente adormecido, su periodoncista comenzará a eliminar y remodelar pequeñas cantidades de tejido de las encías y hueso, lo que resultará en una exposición más natural de los dientes. Una vez completado esto, se colocarán suturas reabsorbibles.

ALARGAMIENTO DE LA CORONA

Que esperar:

- Recetas
- Espacios entre los dientes
- Posible exposición de los márgenes de la corona.
- Sensible a la temperatura
- Malestar leve/moderado
- Inflamación
- Posible recesión de las encías en dientes adyacentes.
- Suturas
- Citas postoperatorias
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico sobre cómo tomarlos antes de la cirugía.

Instrucciones preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.

Instrucciones postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de una cirugía; sin carbonatación
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas
- StellaLife Enjuague 3 veces al día hasta terminar el biberón
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas. Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.