

EXTRACCIÓN DENTAL

Aunque se hará todo lo posible para preservar sus dientes naturales, hay algunos casos en los que es necesario y beneficioso para usted extraer un diente.

Antes de que su periodoncista le extraiga el diente, lo adormecerá con un anestésico local. Una vez que esté adecuadamente adormecido, el diente dañado, cariado o fracturado se extraerá con cuidado y habilidad. Los dientes impactados requerirán cortar el tejido óseo y la encía que cubre el diente. Una vez completado esto, se extraerá el diente mediante el uso de fórceps. En algunos casos será necesario extraer el diente en trozos.

Durante una extracción, el diente que se extrae deja una cavidad abierta dentro del hueso que alguna vez lo sostuvo. Si bien los tejidos blandos alrededor del sitio de extracción sanan y se cierran sobre la abertura con bastante rapidez, el hueso no crece para llenar el área abierta que queda tan rápidamente y, como resultado, la cavidad se llena de tejido blando. Esto puede causar reabsorción o adelgazamiento del hueso, lo que puede afectar la estética y también dificultar la colocación del implante en el futuro. Para garantizar que haya suficiente hueso en la cavidad abierta y evitar la contracción del hueso a su alrededor, es necesario colocar un injerto óseo en la cavidad abierta para preservar el espacio. Los injertos óseos implican colocar hueso en la cavidad abierta inmediatamente después de que se ha extraído un diente. Luego se sutura el sitio de extracción y se cierra con una membrana que protege el sitio de extracción y se agrega un nuevo injerto óseo. Durante este tiempo, el cuerpo sana y hueso nuevo llena el espacio dejado mientras absorbe el injerto que colocó el periodoncista. Una vez que el hueso nuevo sea lo suficientemente denso, puede continuar y su periodoncista le colocará un implante dental.

EXTRACCIÓN DENTAL

Que esperar:

- Recetas
- Espacios entre los dientes
- Posible exposición de los márgenes de la corona.
- Sensible a la temperatura
- Malestar leve/moderado
- Inflamación
- Posible recesión de las encías en dientes adyacentes.
- Suturas
- Citas postoperatorias
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico sobre cómo tomarlos antes de la cirugía.

Instrucciones preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.

Instrucciones

postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de una cirugía; sin carbonatación
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas
- StellaLife Enjuague 3 veces al día hasta terminar el biberón
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas. Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.