



AUMENTO DE CRESTA (GBR)

Un injerto óseo dental es un procedimiento que se realiza en pacientes que requieren un implante dental para los dientes que les faltan, pero que actualmente no tienen una cantidad suficiente de mandíbula para soportar el implante. El deterioro de la mandíbula puede ocurrir por diversas razones, incluidos defectos congénitos, enfermedades de las encías, infecciones, traumatismos o pérdida de dientes durante un período prolongado. La colocación estratégica y la fijación del material de injerto óseo normalmente darán como resultado el desarrollo de una base suficiente en un plazo de tres a nueve meses. Existe una variedad de materiales que se pueden utilizar para el injerto óseo. El material que se utilizará para su injerto óseo dependerá de los detalles de su caso. Lo más habitual es que su periodoncista utilice un injerto hecho de hueso de un cadáver.

El día de su injerto óseo, su médico lo adormecerá usando un anestésico local. Una vez que esté adecuadamente adormecido, su periodoncista hará una incisión en la encía para acceder al hueso. A continuación, se coloca el material de injerto y luego, por lo general, se cubre con una membrana de colágeno que promoverá el crecimiento y protegerá el injerto óseo. A medida que el área continúa sanando, el hueso se volverá más denso. En unos pocos meses tendrá suficiente hueso para soportar un implante dental.

AUMENTO DE CRESTA (GBR)

Que esperar:

- Recetas
- Sensible a la temperatura
- Malestar leve/moderado
- Inflamación
- Suturas
- Citas postoperatorias
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico sobre cómo tomarlos antes de la cirugía.

Instrucciones preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.

Instrucciones postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de una cirugía; sin carbonatación
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas
- StellaLife Enjuague 3 veces al día hasta terminar el biberón
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas. Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.