

GINGIVECTOMÍA

Al sonreír, se sabe que los pacientes que muestran una mayor proporción de encías y dientes tienen una sonrisa gingival. Las sonrisas gingivales pueden desarrollarse por diversas razones y no necesariamente indican que haya algún problema con la salud de los dientes o las encías.

En algunos casos, las sonrisas gingivales pueden ser causadas por una mayor inflamación en los tejidos causada por la enfermedad periodontal o pueden ser una predisposición genética que afecta la forma en que los dientes erupcionan durante el desarrollo temprano. Independientemente del motivo, los pacientes a menudo se sienten cohibidos por su apariencia y buscarán mejorar este problema realizándose un procedimiento de contorno de encías.

El contorno de las encías, o gingivectomía, es un procedimiento que se realiza comúnmente para tratar a pacientes que tienen una cantidad excesiva de tejido de las encías (sonrisa gingival). Durante el procedimiento de contorno de las encías, el periodoncista eliminará el exceso de tejido para crear una línea de las encías más uniforme y estéticamente agradable. Además de la apariencia estética mejorada, el contorno de las encías también mejora la salud bucal general del paciente al reducir la profundidad de las bolsas entre los dientes y las encías.

El procedimiento comenzará cuando su periodoncista le administrará un anestésico local para adormecer el área. Una vez que esté adecuadamente adormecido, su periodoncista usará un bisturí o un láser para eliminar el exceso de tejido y comenzar a remodelar la línea de las encías para lograr una apariencia estética más deseable. Por lo general, el procedimiento se puede completar en una hora y los resultados son inmediatos. Los resultados seguirán mejorando a medida que se produzca la curación en el transcurso de 2 semanas.



GINGIVECTOMÍA

Que esperar:

- Sensible a la temperatura
- Posible recesión de las encías
- Malestar leve/moderado
- Inflamación
- Citas postoperatorias
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico sobre cómo tomarlos antes de la cirugía.

Instrucciones

postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de una cirugía; sin carbonatación
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas
- StellaLife Enjuague 3 veces al día hasta terminar el biberón
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas.
- Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.

Instrucciones

preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.