

REGENERACIÓN GUIADA DE TEJIDOS

Los dientes se mantienen en su lugar mediante encías, huesos y tejido conectivo. La enfermedad periodontal puede causar que el hueso se rompa. Se pueden utilizar procedimientos regenerativos para estimular el crecimiento de hueso nuevo si ha perdido hueso alrededor de un diente. Este crecimiento aumenta la altura del hueso alrededor del diente para proporcionar más soporte y estabilidad alrededor de la raíz del diente. Restaurar incluso la mitad de la cantidad de hueso perdido prolonga la vida del diente. Un tipo de procedimiento regenerativo se llama regeneración tisular guiada (GTR). Los lugares comunes donde se ve la necesidad de este procedimiento son entre las raíces de los dientes posteriores y la parte posterior de un segundo molar (comúnmente se puede observar un defecto después de la extracción de las muelas del juicio).

En ciertos casos, la pérdida ósea por enfermedad periodontal puede provocar defectos en el hueso alrededor de los dientes. GTR es un método utilizado para reparar defectos periodontales para que un diente, o un conjunto de dientes, tenga más soporte y estabilidad. Parte del procedimiento GTR consiste en evaluar quirúrgicamente el defecto y colocar un injerto óseo en el defecto óseo, si la anatomía lo permite. El injerto óseo ayuda a promover el crecimiento de hueso nuevo.

GTR utiliza una membrana de colágeno reabsorbible. Esto evita que el tejido blando, que crece rápidamente, crezca hacia el defecto óseo para que el injerto óseo pueda tener éxito, ya que las células óseas tienden a crecer más lentamente.

El día de la cirugía, su periodoncista primero lo adormecerá con un anestésico local. Luego se abre suavemente la encía y se limpia todo para eliminar todas las bacterias. Se coloca un injerto óseo en el defecto y luego se cubre con una membrana. Luego, los tejidos de las encías se reemplazan sobre el defecto. Luego se asegura el sitio con suturas. Los puntos y la membrana se disuelven o se retiran en la visita postoperatoria de 2 semanas. En aproximadamente 6 meses, han crecido nuevas inserciones y hueso para sostener el diente o los dientes. Deberá mantener una buena higiene bucal y continuar con visitas regulares al dentista para evitar recaídas.

REGENERACIÓN GUIADA DE TEJIDOS

Que esperar:

- Recetas
- Sensible a la temperatura
- Posible recesión de las encías
- Malestar leve/moderado
- Inflamación
- Suturas
- Citas postoperatorias
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico sobre cómo tomarlos antes de la cirugía.

Instrucciones preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.

Instrucciones

postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de una cirugía; sin carbonatación
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas
- StellaLife Enjuague 3 veces al día hasta terminar el biberón
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas. Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.