



RETIRADA DE IMPLANTE DENTAL

Es muy raro que un implante dental provoque complicaciones, pero es una posibilidad. Si tiene un implante dental que ha comenzado a sentirse flojo, incómodo o le causa dolor o malestar, esto puede ser una señal de que está fallando.

Muchos factores pueden contribuir al éxito o fracaso de un implante, algunos de los cuales incluyen: higiene bucal, salud ósea, salud de los tejidos, hábito de fumar y enfermedades sistémicas (como osteoporosis y diabetes).

Cuando un implante dental falla, es fundamental retirarlo antes de que surjan más complicaciones. Para el proceso de extracción del implante, su periodoncista primero adormecerá el área con un anestésico local. Luego utilizarán instrumentos para extraer suavemente el implante preservando la mayor cantidad posible de hueso circundante. Una vez retirado el implante, se reparará la zona afectada con un injerto óseo y se identificará la causa del fallo. Después de un mínimo de 3 meses de curación, se realizará una exploración tridimensional para evaluar la calidad del hueso y determinar si usted es candidato para un nuevo implante.



RETIRADA DE IMPLANTE DENTAL

Que esperar:

- Recetas
- Malestar leve/moderado
- Inflamación
- Suturas
- Citas postoperatorias
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico.

Instrucciones preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.

Instrucciones

postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de una cirugía; sin carbonatación
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas
- StellaLife Enjuague 3 veces al día hasta terminar el biberón
- Analgésicos de venta libre según sea necesario
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas. Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.