

IMPLANTE DENTAL

Además del impacto negativo que la falta de dientes puede tener en la confianza de uno, la falta de dientes también puede causar una variedad de problemas de salud si no se trata durante el tiempo suficiente. Pueden producirse pérdida de la mandíbula, desplazamiento de los dientes, cambios en los patrones de masticación, dificultad para comer y dificultades para hablar. Reemplazar un diente perdido con un implante dental puede mejorar significativamente la calidad de vida, la salud y restaurar la función del paciente.

Un implante dental es un dispositivo médico que se implanta quirúrgicamente en la mandíbula para reemplazar uno o varios dientes faltantes. Proporcionan soporte para una corona, puente o dentadura postiza.

Los implantes se componen de tres partes:

- Cuerpo del implante: un tornillo hecho de titanio, único en su capacidad de fusionarse con el hueso.
- Pilar (conector): Une la prótesis (corona, etc) al implante(s)
- Corona: Visible encima de la línea de las encías, es la parte dental del implante, generalmente hecha de porcelana u otro material cerámico para imitar el aspecto natural de los dientes circundantes.

Para determinar si es candidato para implantes dentales, analice sus opciones con un proveedor dental. Su periodoncista requerirá una tomografía computarizada tridimensional para evaluar la calidad y cantidad de su hueso y poder planificar las mejores opciones para usted. Si se determina que los implantes dentales son la opción de tratamiento óptima para usted, es importante tener en cuenta que todo el proceso puede tardar varios meses de principio a fin e implicará varios pasos, con algunas variaciones según su caso particular. Por ejemplo, algunos pacientes pueden requerir la extracción de un diente dañado y/o un injerto óseo dental antes de colocar el implante.

El día que su periodoncista coloque su implante, primero adormecerá el área con un anestésico local. Luego, su periodoncista hará una pequeña incisión en la encía para exponer el hueso. Se perforará una pequeña zona para acomodar el poste metálico del implante dental. El implante se deja curar durante aproximadamente dos a tres meses para que la mandíbula pueda crecer alrededor del implante y darle estabilidad. Una vez que el implante esté lo suficientemente estable, su dentista general puede colocar la corona encima.

IMPLANTE DENTAL

Que esperar:

- Recetas
- Sensible a la temperatura
- Malestar leve/moderado
- Inflamación
- Posible prótesis temporal para rellenar el espacio faltante
- Suturas
- Citas postoperatorias
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico sobre cómo tomarlos antes de la cirugía.

Instrucciones preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.

Instrucciones postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de una cirugía; sin carbonatación
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas
- StellaLife Enjuague 3 veces al día hasta terminar el biberón
- Analgésicos de venta libre según sea necesario
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas. Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.