



SEDACIÓN IV

La sedación intravenosa se utiliza habitualmente durante procedimientos médicos o dentales para ayudarle a relajarse y reducir la ansiedad. A diferencia de la sedación con óxido nitroso y la sedación oral, los pacientes reciben el sedante por vía intravenosa durante la cita. Esto permite que su cirujano haga lo que se supone que debe hacer de manera eficaz mientras usted se encuentra muy tranquilo y relajado. A continuación, se incluye un resumen de lo que puede esperar:

Efectos de la sedación intravenosa:

- Relajación: te sentirás tranquilo, somnoliento y menos consciente de tu entorno.
- Memoria reducida: es posible que no recuerde mucho o nada del procedimiento después.
- Manejo del dolor: ayuda a reducir la ansiedad, pero a menudo se combina con anestesia local para controlar el dolor.

Durante el procedimiento:

El medicamento sedante se administra a través de una vía intravenosa, generalmente colocada en el brazo o la mano.

Sus signos vitales, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de oxígeno, se controlarán de cerca durante todo el procedimiento.

Riesgos:

- Mínimo: Para la mayoría de las personas, la sedación intravenosa es segura, pero los riesgos incluyen problemas respiratorios, reacciones alérgicas o presión arterial baja. El equipo de atención médica está capacitado para manejar cualquier complicación.
- Es importante seguir cuidadosamente las instrucciones previas y posteriores al procedimiento para garantizar la seguridad y una recuperación sin problemas.

SEDACIÓN IV

Antes del procedimiento:

Se le pedirá que ayune durante algunas horas antes del procedimiento para garantizar que tenga el estómago vacío. El proveedor de atención médica revisará su historial médico, incluidos medicamentos y alergias.

Se le dará el consentimiento informado para firmar después de que se le explique el proceso de sedación.

Después del procedimiento:

Recuperación: Es posible que se sienta aturdido o desorientado a medida que desaparece el efecto del sedante, y la recuperación completa puede llevar varias horas.

Transporte: Necesitará que alguien lo lleve a su casa, ya que no podrá conducir un vehículo. Deberá quedar con un tutor y no estará autorizado a tomar un Uber.

- Se recomienda que la escolta permanezca con el paciente durante todo el día.

Efectos secundarios: Los efectos secundarios comunes incluyen somnolencia, mareos, náuseas o dolor de cabeza, que generalmente desaparecen en unas pocas horas.

- Duerma en un sillón reclinable o apoyado sobre varias almohadas (no acostado en posición horizontal)
- Comience con líquidos claros y alimentos ligeros.
- Mucha hidratación
- Siga las instrucciones de manejo del dolor de su proveedor.