

LAPIP

LAPIP (Protocolo de periimplantitis asistida por láser) es una opción de tratamiento mínimamente invasiva para implantes defectuosos. Es el único tratamiento con láser aprobado por la FDA para corregir la enfermedad periodontal y regenerar el hueso. A diferencia de los métodos tradicionales para tratar implantes defectuosos, que requieren el uso de bisturís para cortar tejido y suturas, LAPIP puede identificar y matar bacterias sin dañar el tejido de las encías circundante. Los pacientes suelen preferir ser tratados con LAPIP porque genera menos molestias y el proceso de curación es mucho más rápido.

Los pacientes que padecen enfermedad de periimplantitis tienen esencialmente dos opciones en cuanto al tipo de tratamiento que pueden recibir: cirugía tradicional o LAPIP.

La cirugía de encías tradicional generalmente implica el uso de un bisturí para exponer la mandíbula y el implante doblando las encías hacia atrás. Una vez accesible esta zona, se eliminan los restos y el sarro. Si hay algún defecto óseo, se colocan materiales de injerto óseo o se remodela el hueso. Después de esto, las encías se suturan en su lugar y se dejan curar. Si bien este es un enfoque predecible en el caso de los dientes, los resultados son menos predecibles en el caso de los implantes.

LAPIP realiza una función similar de eliminar tejido enfermo y matar bacterias, pero lo logra mediante el uso de un láser y no requiere bisturí ni suturas. El láser penetra debajo de la superficie del tejido y destruye cualquier bacteria, placa o tejido infectado. Una vez que se haya eliminado el tejido infectado, su periodoncista utilizará instrumentos para eliminar el cálculo. Finalmente, la segunda ronda del láser sellará el área adyacente al implante, lo que también estimula a las células madre a desarrollar hueso alrededor del implante. Este proceso asegura que no se elimine tejido y facilita la formación de colágeno, hueso y tejido conectivo.

El día de su tratamiento, su periodoncista comenzará adormeciéndolo adecuadamente con un anestésico local. Sólo necesitará una visita para este tratamiento, incluso si está tratando varios implantes. En comparación con la cirugía periodontal tradicional, el tiempo de recuperación después del procedimiento es mucho más rápido y sencillo y, por lo general, no requiere tiempo de inactividad después del tratamiento. Su periodoncista lo traerá inicialmente cada pocas semanas para evaluar la curación. Los resultados finales del tratamiento se miden después de al menos 6 meses.



LAPIP

Que esperar:

- Recetas
- Espacios entre los dientes
- Posible exposición de los márgenes de la corona.
- Sensible a la temperatura
- Malestar leve/moderado
- Inflamación
- Posible recesión de las encías en dientes adyacentes.
- Citas postoperatorias
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico sobre cómo tomarlos antes de la cirugía.

Instrucciones preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.

Instrucciones postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de una cirugía; sin carbonatación
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas
- StellaLife Enjuague 3 veces al día hasta terminar el biberón
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas. Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.