

CIRUGÍA ÓSEA

La cirugía ósea, también llamada cirugía de reducción de bolsas, elimina las bacterias, remodela los defectos del hueso y hace que las zonas afectadas sean más fáciles de limpiar para usted. Durante su examen periodontal, su especialista medirá la profundidad de las bolsas de sus encías y revisará los hallazgos con usted. Lo ideal es que estas medidas no superen los 3 milímetros. Cuando un bolsillo mide más de 6 milímetros, limpiar el área se vuelve un desafío en casa y durante una limpieza profesional realizada por un higienista dental. Es en este punto que se le recomendará que complete el raspado y alisado radicular (SRP). Si después de su cita de reevaluación de SRP de 1 mes todavía tiene bolsas mayores a 6 milímetros, es posible que se requiera una intervención quirúrgica.

Cuando las bolsas profundas no se pueden limpiar adecuadamente, las bacterias comenzarán a destruir las encías y el hueso que rodean los dientes. Si no se trata, las bolsas seguirán haciéndose más profundas y el diente se aflojará y aumentará la posibilidad de que se pierda. Eliminar o reducir las bolsas creadas por la enfermedad de las encías es el objetivo principal de la cirugía ósea.

El día de la cirugía, su periodoncista lo adormecerá adecuadamente utilizando un anestésico local. Su periodoncista hace una pequeña incisión en la línea de las encías para doblar las encías hacia atrás y eliminar las bacterias que se encuentran debajo. Después de eliminar las bacterias, su periodoncista suavizará áreas del hueso para ayudar a que el área sea más fácil de limpiar en casa. Si tiene daño óseo grave, es posible que se recomiende una técnica de regeneración periodontal. Su médico hablará más sobre estos procedimientos si son necesarios. Las encías se vuelven a unir mediante suturas. Su médico querrá verlo en visitas de seguimiento para asegurarse de que todo se esté curando adecuadamente.

CIRUGÍA ÓSEA

Que esperar:

- Recetas
- Espacios entre los dientes
- Posible exposición de los márgenes de la corona.
- Posible aumento de la movilidad
- Sensible a la temperatura
- Malestar leve/moderado
- Inflamación
- Posible recesión de las encías en dientes adyacentes.
- Suturas
- Citas postoperatorias
- Si toma ASPIRINA, continúe tomándola.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, siga las instrucciones de su periodoncista y de su médico sobre cómo tomarlos antes de la cirugía.

Instrucciones preoperatorias:

- Sin cafeína el día del procedimiento.
- Sin alcohol antes del procedimiento.
- No fumar antes o después del procedimiento.

Instrucciones

postoperatorias:

- Dieta de alimentos blandos después de una cirugía; sin carbonatación
- Sin pajitas, escupir, hacer buches fuertes
- Evite levantar objetos pesados o hacer ejercicio
- Debe mantener una buena higiene bucal.
- Uso de cepillo de dientes suave durante la primera semana.
- Bolsa de hielo solo durante las primeras 24 horas
- StellaLife Enjuague 3 veces al día hasta terminar el biberón
- Para controlar el dolor y reducir la inflamación, tome 600 mg de ibuprofeno (equivalente a 3 comprimidos de 200 mg de venta libre), espere 3 horas y luego tome 500 mg de paracetamol (1 comprimido de venta libre). Continúe alternando los medicamentos cada 3 horas. Si esto no alivia el dolor, tome 600 mg de ibuprofeno y 500 mg de paracetamol al mismo tiempo, cada 6 horas. Si le recetaron medicamentos, siga las instrucciones del envase.