

STENTS QUIRÚRGICO

Un férula quirúrgica es un dispositivo de plástico transparente y removible que se coloca sobre los dientes y las encías inmediatamente después de un injerto de tejido blando u otros procedimientos periodontales. Su función principal es proteger la zona quirúrgica durante las primeras etapas críticas de la cicatrización. La férula ejerce una presión suave que ayuda a minimizar el sangrado y la inflamación, a la vez que actúa como barrera entre la delicada zona quirúrgica y las mejillas, la lengua y los alimentos.

Al cubrir la zona injertada, la férula favorece una recuperación más cómoda, previene traumatismos accidentales y permite que el tejido cicatrice correctamente. Los pacientes suelen reportar menos dolor e irritación al usar la férula en comparación con la cicatrización sin ella.

Durante las primeras 24 horas después de la cirugía, la férula debe permanecer colocada en todo momento. Esto es esencial para la estabilización del coágulo. Transcurrido este periodo, la férula se puede retirar brevemente para limpiarla, pero debe usarse continuamente durante las primeras 72 horas, especialmente durante las comidas, para evitar la irritación de la zona quirúrgica.

Después de las primeras 72 horas, el uso de la férula es opcional. Algunos pacientes optan por seguir usándolo para mayor comodidad, especialmente si comer les resulta más fácil con la prótesis colocada. Otros prefieren usarla solo cuando sea necesario. En definitiva, su propósito es mejorar la comodidad, proteger los tejidos en proceso de cicatrización y favorecer la recuperación.

Dado que la prótesis está hecha de plástico transparente, límpiela con jabón líquido o de manos sin perfume. Nunca utilice agua caliente, pasta dental abrasiva ni productos químicos fuertes para limpiarla, ya que pueden dañar o deformar el material.

La prótesis quirúrgica es una ayuda temporal para la cicatrización, pero durante el tiempo que se usa, desempeña un papel fundamental para garantizar el éxito del injerto. El uso y cuidado adecuados de la prótesis pueden mejorar significativamente la experiencia de cicatrización y los resultados a largo plazo del tratamiento periodontal.

STENTS QUIRÚRGICO

Que esperar:

- Dispositivo transparente y removible que se coloca después de un injerto de encía.
- Protege y estabiliza la zona quirúrgica durante la cicatrización inicial.
- Ayuda a minimizar el sangrado y la irritación.
- Puede sentirse ajustado o ligeramente apretado al principio.
- Uso temporal, principalmente durante los primeros días de recuperación.

Instrucciones

postoperatorias:

- No retire el stent durante las primeras 24 horas después de la cirugía.
- Después de 24 horas, retire con cuidado el stent para limpiarlo con agua tibia y jabón suave.
- Días 1 a 3: Use el stent continuamente, incluso al comer; retírelo y límpielo con agua y jabón después de las comidas.
- Después de 3 días: El uso del stent es opcional, pero puede continuar usándolo para mayor comodidad o protección, según lo desee.
- No use agua caliente ni pasta de dientes para limpiar el stent, ya que esto podría dañar el plástico.
- Guárdelo siempre en su estuche protector cuando no lo use.
- Llame a su médico si el stent se siente suelto, causa irritación o se rompe.